

小惑星 Icarus の自転周期と YORP 効果

岡山大学 理学部 地球科学科

05424513 櫻井 友里

2016/02/12

要旨

小惑星 Icarus は YORP 効果の検出が期待されている小惑星のひとつである。YORP 効果とは、非対称な形状をした天体において、太陽光の反射と天体表面からの熱放射が非等方的に生じることによってトルクが発生し、自転軸や自転速度に変化を生じさせるという効果である。

Gehrels et al. (1970) は 1968 年におこなった観測に基づいて Icarus の自転周期を $2^h16^m23^s \pm 3^s$ (2.273 時間) と報告している。本研究では、西はりま天文台の 2m なゆた望遠鏡と近赤外線撮像装置 NIC を用いて、J バンドで Icarus の測光観測をおこない、Icarus の自転周期を求めることで YORP 効果の検出を試みた。

本研究で Icarus の自転周期は 2.12 時間と推定された。この結果は 1968 年の観測で推定された自転周期 2.27 時間に比べて 0.15 時間 (約 10 分) 短い。今回は観測日数が 1 夜と少なく、十分な量の観測ができなかったため、この結果のみで Icarus の自転周期が変化したと結論づけることはできないが、Icarus は YORP 効果によって自転周期が変化している可能性がある。

目次

第 1 章 序論	4
1.1 小惑星 1566 Icarus	4
1.2 研究の概要	4
第 2 章 YORP 効果	5
2.1 YORP 効果	5
2.2 小惑星の自転周期	6
第 3 章 観測	8
3.1 観測地点	8
3.2 観測機器	8
3.3 近赤外線での観測	9
3.4 観測方法	10
第 4 章 解析	11
4.1 一次処理	11
4.1.1 画像の重ね合わせ	12
4.2 測光	13

小惑星 Icarus の自転周期と YORP 効果	3
4.2.1 測光方法	14
4.3 相対測光	17
4.4 自転周期の推定	18
第 5 章 結果・考察	20
5.1 結果	20
5.2 考察	20
第 6 章 まとめ	22
謝辞	23
参考文献	24

第1章 序論

1.1 小惑星 1566 Icarus

1566 Icarus は地球に接近する軌道をもつ地球近傍小惑星のひとつで、軌道長半径は 1.078AU、離心率は 0.827 である (NASA JPL's HORIZONS System). 大きさは直径 1km と小さく、1968 年の観測を解析した結果によると自転周期は 2.273 時間というかなり高速の自転をしている (Gehrels et al., 1970). この速い自転に関連して、Icarus は YORP 効果の検出が期待される小惑星のひとつとして注目されている (Rubincam, 2000).

表 1.1: 1566 Icarus の物理パラメータ (出典: NASA JPL's HORIZONS System)

公転周期 (年)	軌道長半径 (AU)	離心率	直径 (km)	自転周期 (h)
1.12	1.078	0.827	1.0	2.2726

1.2 研究の概要

本研究では、YORP 効果の検出を目標として、Icarus の測光観測をおこない、Icarus の自転周期を推定した。

観測は、岡山大学天文台で 2015 年 6 月 16 日～6 月 26 日まで、西はりま天文台で 2015 年 6 月 18 日～6 月 21 日まで、計 11 夜おこなった。天候不良のため、データを取得することができたのは 2015 年 6 月 21 日夜の西はりま天文台の観測のみとなったが、このデータから Icarus の明るさの時間変化を抽出し、自転周期を推定した。

第2章 YORP 効果

2.1 YORP 効果

YORP 効果とは、非対称な形状をした天体で発生する、自転軸や自転速度を変化させる効果のことである。非対称な形状により、太陽光の反射と天体表面からの熱輻射が非等方的になることにより、トルクが生じる (e.g., Rubincam, 2000). 現在, Geographos, Appollo, Itokawa, YORP の4天体について, YORP 効果による自転周期の変化が検出されている (Durech et al., 2008, Kaasalainen et al., 2007, Taylor, 2007, Lowry et al., 2014).

非対称な形状をした天体で太陽光の反射によってトルクが発生することについて、赤道に三角柱が付いた天体を例にして説明する (図 2.1). この図で太陽は左下の方向にあり、図の白い矢印は太陽光、青い矢印は太陽光が反射して出ていく方向を表している。

三角柱が太陽から見て右にある場合、太陽光は入射方向に垂直な当たり、天体を反時計回りに回転させるトルクを生じさせる。天体が自転して三角柱が左側にきた場合にもトルクは生じる。右側と左側にある場合で、太陽光に対する三角柱の面の角度が同じならば、トルクは右側と左側で大きさが等しく向きが反対になるため完全に打ち消しあう。しかし図のように三角柱の面が太陽光に対して異なる角度で向く場合には、トルクの大きさと向きが反対にならないため、正味でトルクが残る。これが YORP 効果である。

物体の慣性モーメントはおおよそ大きさの5乗に比例するのに対し、輻射によって生じるトルクは面積と重心からの距離、すなわち大きさの3乗に比例する。そのため、小さな天体ほど YORP 効果は効く。また、天体の形状の非対称が大きいくほど YORP 効果は大きくなる。




図 2.1: YORP 効果の説明図

(http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kisohp/RESEARCH/symp2007/pdf/kiso2007_kitasato.pdf)

2.2 小惑星の自転周期

図 2.2 は小惑星の大きさと自転周期を描いたものであるが、直径 200m 以上の小惑星の自転周期は 2.2 時間以上であることがわかる (Urakawa et al., 2014). これは、小惑星がラブルパイル構造 (複数の岩塊が重力により弱々しく結合した状態) であることに関係していると考えられている. ラブルパイル構造の小惑星は自転が速くなり遠心力が大きくなると分裂する. 自転周期 2.2 時間以下で速く自転しているものは、ラブルパイル構造ではないひとまとまりの岩塊と考えられている.

Icarus の 2.273 時間という自転周期は、ラブルパイル構造の小惑星が分裂するほぼ限界の速さである. YORP 効果によって自転周期がこれより速くなると、Icarus は分裂する可能性がある.




図 2.2: 小惑星の直径と自転周期の関係. LCDB(Lightcurve Database) に登録されている小惑星のデータと, 直径 200m 以上かつ自転周期 2.2 時間以下の特徴的な小惑星のデータを記載. (Urakawa et al. (2014) から引用)

第3章 観測

3.1 観測地点

観測は西はりま天文台でおこなった．西はりま天文台は兵庫県佐用郡佐用町大撫山の頂上付近 (東経 $134^{\circ}20'08''$ ，北緯 $35^{\circ}01'31''$ ，標高 449m) に位置している．



図 3.1: 西はりま天文台
2015 年 6 月 20 日撮影.

3.2 観測機器

観測には西はりま天文台の 2m なゆた望遠鏡，近赤外線撮像装置 NIC を使用した．NIC では J バンド，H バンド，K バンドの三色を同時に観測できる．J，H，K バンドそれぞれの中心波長は $1.2\mu\text{m}$ ， $1.7\mu\text{m}$ ， $2.3\mu\text{m}$ である．本研究では J バンドのみを使用した．



図 3.2: 口径 2m なゆた望遠鏡
2015 年 6 月 18 日撮影.




図 3.3: 近赤外線撮像装置 NIC
(http://www.nhao.jp/%7Enic/nic_wiki/index.php)

3.3 近赤外線での観測

近赤外線では、背景放射成分の除去が重要となる。背景放射とは、地球大気や望遠鏡から射出される熱輻射のことである。近赤外線の背景光は、観測装置の温度や大気の状態により、その明るさや視野内での明るさのパターンが変化する。そのため、背景光を取り除くには、観測した画像そのものを使用する必要がある。本研究では背景放射の影響を取り除くため、ディザリングと呼ばれる方法で観測をおこなった。

ディザリングとは、望遠鏡の向きを少しずつずらして同じ場所に天体が写らないように撮像する方法のことである。今回は図 3.4 で示される 10 点で撮像をおこなった。ディザリングで撮像された画像を重ね合わせて中央値 (メジアン) をとると、天体が消えて背景光のみの画像を得ることができる。天体の明るさを測光する際には、天体が重なるように画像をずらして重ね合わせた (加算した) 画像を用いた。こうすることで光量を増やして測定精度を向上させることができる。




図 3.4: 本研究でおこなったディザリング (Nagayama (2014) から引用)

3.4 観測方法

画像を1枚取得するための積分時間は Icarus が 10 秒，標準星は 5 秒とした．ディザリングして 10 枚の画像を取得するため，1 回の観測にかかる時間は Icarus で約 5 分，標準星で約 3 分である．6 月 21 日は Icarus と標準星の観測を交互に 20 回ずつおこない，計 400 枚の画像を取得した (図 3.5)．




図 3.5: 観測の間隔

第4章 解析

本研究では撮像した天体の画像を解析するのに、IRAF(<http://iraf.noao.edu>) と DS9(<http://ds9.si.edu/site/Home.html>) というソフトウェアを使用した。

4.1 一次処理

取得した各画像について、近赤外線撮像装置 NIC の標準的な処理である、ダーク引き、フラット補正、バットピクセル補正、ホットピクセル・ダークピクセル除去、スカイ画像合成、スカイ引き、縦パターン除去、をおこない、その後にディザリングして取得した 10 枚の画像の重ね合わせをおこなった。上記の処理は西はりま天文台で使われているスクリプトを用いておこなったが、半分程度のセットについてはスクリプトによる重ね合わせ処理に失敗したため、手動で重ね合わせをおこなった。

図 4.1 は一次処理後の画像である。赤い丸で囲っている天体が Icarus である。小惑星は惑星と同様に太陽の周りを公転しているため、他の恒星の日周運動とは異なる動きをする。そのため小惑星に合わせて画像を合成すると、他の天体は列状に並ぶ。




図 4.1: 一次処理後の画像

4.1.1 画像の重ね合わせ

IRAF, DS9 を用いて手動で画像を重ね合わせる手順を説明する. 画像の重ね合わせ方法については, 画像整約と三色合成 (<http://www.wakayama-u.ac.jp/~atom-ita/ccd/3color/>) というサイトを参考にした.

まず xterm 上で下記のコマンドを打ち, IRAF と DS9 を立ち上げる.

```
$ ds9 &  
$ cl
```

次に DS9 上に撮像した画像を表示し, 星の像の重心位置を調べ, 各フレームごとの相対的な位置のずれを見る. 星の重心位置を調べるには IRAF の imexam というタスクを使用する.

```
cl > display (撮像した天体の画像名) 1  
cl > imexam keeplog=yes logfile=imexam.log
```

上記のコマンドを打つと DS9 上に小さな円形のカーソルが点滅して出てくる. これを星の上に乗せ, r のキーを押す. そうすると図 4.2 が表示される. 図中の + マークは実測点, 破線は実測点に合うようなガウス関数曲線である. + マークが平坦な頂上を作っていると, その星は飽和しているため解析には使えない. 重心位置はグラフの上に Radial profile at xxx.xx yyy.yy と書かれているが, この値は imexam.log というファイルにも書き出されている. imexam を終了する際は q を押す.

1 セット 10 枚の画像すべてに対して imexam の結果が取得できたら, 基準とする座標値を決め, その値と各画像の星の座標値との相対差を計算する. そして各画像について, IRAF の imshift というタスクを使用して星の位置を基準の座標値との相対差分ずらす.

```
cl > imshift (撮像した天体の画像名) (出力する画像名) (x 座標の相対差) (y 座標の相対差)
```

imshift が終わった画像は DS9 上に display で表示して全てほぼ同じ写りの画像かを確認し, 問題がなければ IRAF の imcomb というタスクを使用して重ね合わせる.

```
cl > imcomb (重ね合わせをおこなう画像名) (出力する画像名) combine=average  
zero=median
```

最後に、スカイの光子ノイズを測光エラーに考慮するため、重ね合わせた画像にスカイの明るさを足す。本研究ではスカイの明るさを Icarus では 30、標準星では 18 と設定して足した。画像に数値を足す際には、IRAF の `imarith` というコマンドを使用する。

```
cl > imarith (画像名) + (スカイの明るさ) (出力する画像名)
```

手動で合成した画像を図 4.3 に示す。画像をずらしたことにより両端に横線が見えるが、星の明るさを測定する際には影響はない。




図 4.2: imexam の結果




図 4.3: 手動で重ね合わせた画像

4.2 測光

星の明るさを測定することを測光と呼ぶ。星の明るさを測定するときに気をつけなければならないことは、星の他に空も光を出しているということである。図 4.5 は図 4.4 の青線上のカウント値がどのくらいであることを示した図である。カウント値が 13~60 程度あるところは星の光を感知している素子である。しかし星の光を感知していないことが予想される素子でも 13 程度のカウント値を示している。これが空の明るさである。つまり星本来の明るさに空の明るさが上乗せされていることになる。そのため星の明るさを測定する際には、星の明るさと空の明るさを測り、星の明るさから空の明るさを引く必要がある。




図 4.4: Icarus の画像




図 4.5: 図 4.4 の青いラインの星と空の明るさ

4.2.1 測光方法

IRAF, DS9を用いた測光方法の説明をする. IRAF で星を測光する上で必要となる様々なパラメータの設定は, Minor Planet at 366 (<http://www.toybox.rgr.jp/mp366/>) というサイトを参考にした.

まず, IRAF の `imexam` というタスクを使用して星の FWHM を求める. ここで, FWHM とは星像の半値全幅のことである. 4.1.1 で示した方法で IRAF, DS9 を立ち上げ, `imexam` を使用できるようにする. 測光する星にカーソルを当てて `a` キーを押すと, `xcterm` ウィンドウに FWHM の値として `ENCLOSED`, `MOFFAT`, `DIRECT` の 3 種類が表示される. 本研究では Icarus, 標準星それぞれについて, `ENCLOSED` の値の中央値を FWHM の値として使用した.

IRAF の `apphot` というタスクを使用し, パラメータの設定をおこなう. `apphot` では 5 つの画面に切り替えてパラメータの編集をおこなう. まず最初に `phot` パラメータの編集をする.

```
cl > epar phot
```

この画面 (図 4.6) では `radplot` の初期値が `no` となっているので, `yes` に修正する.

カーソルを `datapar` の行に移動させ、`:e` と入力し `detapar` の編集画面に移行する (図 4.7). この画面では `fwhmpsf` に `imexam` で求めた FWHM の値を入力する. `exposur`, `filter`, `obstime` には撮像した画像の FITS ファイルのヘッダのキーワードを指定しておく. `datamin` にはリニアリティーの保証範囲を, `datamax` には読み出しノイズの 3 倍程度の負の数を入力する. 編集が終わったら `:q` と入力し `phot` の画面に戻る.

カーソルを `centerp` の行に移動させ、`:e` と入力し `centerp` の編集画面に移行する (図 4.8). この画面では `cbox` に FWHM の 2 倍程度の値を, `maxshif` は 2 ピクセルと入力する. 編集が終わったら `:q` と入力し `phot` の画面に戻る.

カーソルを `fitskyp` の行に移動させ、`:e` と入力し `fitskyp` の編集画面に移行する (図 4.9). この画面では `annulus`, `dannulus` の値を入力する. `annulus` とはスカイの内径のことであり, `dannulus` とはスカイの幅のことである. `annulus` には `apertur+1.0` した値を入力し, `dannulus` には `FWHM*1.0` した値を入力する. 編集が終わったら `:q` と入力し `phot` の画面に戻る.

カーソルを `photpar` の行に移動させ、`:e` と入力し `photpar` の編集画面に移行する (図 4.10). この画面では `apertur` の値として, `FWHM*1.5` した値を入力する. `zmag` には 0 と入力する. 編集が終わったら `:q` を 2 回押し, パラメータの編集を終了する.

続いて `apphot` タスクを使用して測光をおこなう.

```
cl > display (測光する画像名) 1
cl > phot
```

上記のコマンドを打つと DS9 上に円形のカーソルが出てくる. これを星の上に合わせスペースキーを押すと, 図 4.11 のような星のプロファイルが表示される. また `xgterm` 上には簡単な測定結果が表示される. `ok` という表記があれば測光は成功している. 測光を終了する際は, DS9 上にカーソルを合わせて `q` キーを押し, `xgterm` 上にカーソルを合わせて `q` キーを押す. 詳細な測光結果は, (測光した画像名).mag.1 という名称のファイルに出力される.

本研究で測光に使用したパラメータは表 4.1 に示す.

表 4.1: 本研究で設定したパラメータの数値

	Icarus	標準星
FWHM	8.5	8.2
datamin	-20	-20
datamax	8000	8000
cbox	20	20
annulus	13.75	13.3
dannulus	8.5	8.2
apertur	12.75	13.3




図 4.6: apphot の編集画面




図 4.7: datapar の編集画面




図 4.8: centerp の編集画面




図 4.9: fitskypars の編集画面



図 4.10: photpar の編集画面




図 4.11: Icarus の測光結果

4.3 相対測光

本研究では天体の明るさを測定する際に相対測光を使用した。相対測光とは観測対象の星の明るさを近傍にある星の明るさと比較して明るさを決める方法である。比較に使用する星のことを比較星と呼び、ターゲットである星と比較星に含まれる大気減光の影響が同じならば、相対測光をすることで大気減光によらない星そのものの明るさの変動を見ることができる。

近赤外線撮像装置 NIC の視野の広さ ($2.7' \times 2.7'$) では、Icarus と同じ視野内に適切な比較星が存在することを期待できない。そのため、本研究では比較星とする標準星は別途撮像した (図 3.5)。

図 4.12 は Icarus と標準星を測光した結果である。完全に一致しているわけではないが、一方が暗いときもう一方も暗くなっていることから、この 2 つの星は大気減光の影響を同じように受けていることがわかる。

図 3.5 で示したように、今回の観測では Icarus と標準星を交互に観測したため、Icarus を観測した時刻と標準星を観測した時刻に数分間の差がある。そのため、Icarus を観測した時刻における標準星の機械等級を以下の式 (4.1) を使用して推定した。

$$\frac{m_1(t_2 - t) + m_2(t - t_1)}{(t_2 - t_1)} \quad (4.1)$$

ここで t は Icarus を観測した時刻、 t_1 と t_2 は標準星を観測した時刻で、 m_1 と m_2 は t_1 と t_2 に観測された標準星の明るさである。

図 4.13 は相対測光の結果である．Gehrels et al. (1970) の観測結果では，Icarus の自転による明るさの変化は 0.1 等級程度であった．本研究の測光結果をみると，0.1 等級より大きな変化が見られる．また，Icarus を観測した日は曇り空で空が安定していなかった．特に 22 時半～23 時半と 24 時半以降は雲が多く出ていてその影響があったと判断されるため，赤の丸で囲っている 4 点はうまく測光できていないものとして自転周期の推定から除外した．




図 4.12: 青色が Icarus の測光結果，橙色が標準星の測光結果




図 4.13: 相対測光の結果

4.4 自転周期の推定

天候不良などによってよく測光できなかったデータを除外した後に残った 8 個の測光データから Icarus の自転周期の推定をおこなった．本研究で得られた 8 個の測光データは量的に十分ではなく，これだけから Icarus の自転周期を推定することは難しかったため，ライトカーブの形は Gehrels et al. (1970) が観測したものと同じであることを仮定し，自転周期のみを最小自乗法によって推定した．

図 4.14 は Gehrels et al. (1970) で報告されている Icarus のライトカーブ，図 4.15 は図 4.14 のライトカーブを Icarus の自転周期である 2.273 時間で折り返してプロットし，回帰曲線を求めたものである．本研究では図 4.7 のライトカーブを使用して自転周期を推定した．




図 4.14: Gehrels et al. (1970) で報告されている Icarus のライトカーブ




図 4.15: 図 4.14 のライトカーブを 2.273 時間で折り返しプロットしたものと、その回帰曲線

第5章 結果・考察

5.1 結果

図 5.1 は本研究の測光結果について、自転周期を仮定して Gehrels et al. (1970) のライトカーブにフィッティングしたときの残差を描いたものである。自転周期を 2.12 時間としたときにフィッティングの残差がもっとも少なくなった。この自転周期を 2.12 時間にしたときの観測結果と Gehrels et al. (1970) のライトカーブを重ねて描いたものが図 5.2 である。




図 5.1: 仮定した自転周期とフィッティングの残差




図 5.2: フィッティングの結果 (自転周期 2.12 時間)

5.2 考察

本研究で求めた 2.12 時間という自転周期は、ラブルパイル構造が保たれる上限の 2.2 時間より 0.08 時間 (約 5 分) 短い。この自転周期が正しいとすると、Icarus はラブルパイル構造ではなく、ひとかたまりの岩塊である可能性が示唆される。あ

るいは、ラブルパイル構造であるとしたら、近い将来に分裂する可能性がある。

第6章 まとめ

2015 年 6 月 21 日に西はりま天文台で観測をおこない、その結果を用いて Icarus の自転周期を推定した。

本研究で推定された Icarus の自転周期は 2.12 時間で、これは 1968 年の観測で推定された自転周期 2.273 時間に比べ約 10 分短い。

今回は十分な量の観測ができなかったため、この結果のみで Icarus の自転速度が変化したと結論づけることはできないが、Icarus は YORP 効果によって自転速度が変化している可能性がある。

謝辞

本研究をおこなうにあたり，ご指導いただきました指導教官である はしもと じょーじ 准教授に心より感謝いたします。

日本スペースガード協会の浦川聖太郎助教には，Icarus の観測方法を教えていただき，また解析を進める上で様々なアドバイスをいただきました。

西はりま天文台の高橋隼研究員には，西はりま天文台のなゆた望遠鏡，近赤外線撮像装置 NIC の操作方法の説明をしていただき，また一時処理の手順について教えていただきました。

同研究室の先輩方や同期の皆様には，研究を進める上で様々な相談に乗っていただきました。ありがとうございます。

参考文献

Gehrels, T., E. Roemer, R. C. Taylor, and B. H. Zellner (1970) : Minor Planets and Related Objects. IV. Asteroid (1566) Icarus. *Astron. J.* 75, 186-195.

Rubincam, D. P. (2000) : Radiative Spin-up and Spin-down of Small Asteroids. *Icarus* 148, 2-11

Durech, J., D. Vokrouhlicky, M. Kaasalainen, D. Higgins, Yu. N. Krugly, N. M. Gaftonyuk, V. G. Shevchenko, V. G. Chiorny, H. Hamanowa, V. Reddy, and R. R. Dyvig (2008) : Detection of the YORP effect in asteroid (1620) Geographos. *A&A* 489, 25-28

Kaasalainen, M., J. Durech, B. D. Warner, Y. Krugly, N. Gaftonyuk, and D. Higgins (2007) : Detecting YORP Effect with Photometry: (1862) Apollo. *Nature* 446, 420

Taylor, P. A., J-L. Margot, D. Vokrouhlicky, D. J. Scheeres, P. Pravec, S. C. Lowry, A. Fitzsimmons, M. C. Nolan, S. J. Ostro, L. A. M. Benner, J. D. Giorgini, and C. Magri (2007) : Spin Rate of Asteroid (54509) 2000 PH5 Increasing Due to the YORP Effect. *Science* 316, 274

Lowry, S. C., P. R. Weissman, S. R. Duddy, B. Rozitis, A. Fitzsimmons, S. F. Green, M. D. Hicks, C. Snodgrass, S. D. Wolters, S. R. Chesley, J. Pittichova, and P. van Oers (2014) : The internal structure of asteroid (25143) Itokawa as revealed by detection of YORP spin-up. *A&A* 562, 48

Urakawa, S., K. Ohtsuka, S. Abe, T. Ito, and T. Nakamura (2014) : Fast Rotation of a Subkilometer-sized Near-Earth Object 2011 XA₃. *Astron. J.* 147, 121-128.

NASA JPL's HORIZONS System, <http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi>

画像の制約と三色合成, <http://www.wakayama-u.ac.jp/~atomita/ccd/3color/>

Minor Planet at 366, <http://www.toybox.rgr.jp/mp366/>

フリーソフトウェア IRAF, <http://iraf.noao.edu>

フリーソフトウェア DS9, <http://ds9.si.edu/site/Home.html>